

Ibumetin® Junior

Ibumetin® Junior er en oral opløsning, der indeholder 20 mg ibuprofen/ml. Produktet har jordbærsmag og indeholder ikke farvestoffer. Ibumetin® Junior kan bruges til børn fra 6 måneder (over 7 kg) til behandling af

- Feber
- Mild til moderat smerte såsom tandpine, smerter efter indgreb, hovedpine (herunder migræne), menstruationssmerter samt muskel- og ledsmerter (f.eks. rygsmerte, mindre skader, såsom forstuvninger eller forstrækninger)
- Smertefulde tilstande (f.eks. ondt i halsen og ørepine) forårsaget af betændelse i svælget, betændelse i mandlerne og mellemørebetændelse.


Kan også anvendes ved akutte, smertefulde tilstande og feber forbundet med almindelig forkølelse.

Behandlingsvejledning

Læs altid indlægssedlen inden brug. Tabellen nedenfor er vejledende. Følg altid lægens anvisninger. Dosen skal gives hver 6. time, op til fire gange dagligt.

Vægt	Alder	Dosis
7-10 kg	6-12 måneder	2,5 ml / 3 gange dagligt
10-14,5 kg	1-2 år	2,5 ml / 3-4 gange dagligt
14,5-25 kg	3-7 år	5 ml / 3-4 gange dagligt
25-40 kg	8-12 år	10 ml / 3-4 gange dagligt

Når flasken er åbnet, skal Ibumetin® Junior oral suspension opbevares under 25 °C og anvendes inden for 6 måneder.



Vejledning i korrekt brug:

Figur 1: Ryst flasken før anvendelse

Figur 2: Tag sprøjten og træk let i stemplet

Figur 3: Tryk spidsen af sprøjten ind i adapteråbningen.
Tryk stemplet langsomt ned for at få luft i flasken


Figur 4: Vend flasken på hovedet uden at fjerne sprøjten

Figur 5: Træk op i stemplet og fyld sprøjten med en mængde suspension, der er lidt større end den anbefalede dosis

Figur 6: Hvis der kommer bobler til syne i sprøjten, holdes flasken på hovedet, og der trykkes let på stemplet, indtil boblerne trækkes tilbage igen. Gentag, indtil der ikke længere er bobler i sprøjten

Figur 7: Tryk stemplet langsomt ned til mærket, der svarer til den anbefalede mængde i millimeter (ml)

Figur 8: Anbring flasken opret igen og fjern sprøjten



Bivirkninger

Almindelige bivirkninger ved brug af ibumetin® Junior er hovedpine, opkast, diarré, mavesmerter, dyspepsi, kvalme, forstoppelse, eksem og træthed. Læs indlægssedlen for ualmindelige og sjældne bivirkninger.